

Behandling af rynker og furer med ikke-permanente fillers

Patientvejledning

Hvad er ikke-permanente fillers?

Ikke-permanente fillers består af en gel af samme type hyaluronsyre, som forekommer naturligt i kroppens bindevæv. De forskellige ikke-permanente fillers adskiller sig ved gelens viskositet, og om der er andet end hyaluronsyre blandet i (f.eks. lokalbedøvelse). De tykkeste geler anvendes til behandling af kinder, de næsttykkeste til dybere furer og folder, f.eks. furen fra næsen til mundvigen. De lidt tyndere er velegnet til rynker f.eks. ved munden og i panden. Endelig findes der ikke-permanente fillers specielt til læberne.

Hvad går behandlingen ud på?

Med alderen reduceres mængden af hyaluronsyre i huden og huden bliver slappere. Når ikke-permanente fillers indsprøjtes i folder og furer opstået som følge heraf, udfyldes og gattes disse, fordi gelen giver ny volumen i huden og gør den mere spændstig. Da der er en løbende nedbrydning af hyaluronsyre i huden, vil effekten aftage efterhånden.

Behandlingen

Den klare gel indsprøjtes i huden med en tynd nål. Gelen indeholder lokalbedøvelse, hvilket tager det største ubehag forbundet med behandling. Behandlingen varer få minutter.

Efter behandlingen

Umiddelbart efter behandlingen vil huden reagere på indsprøjtningen ved at være let til moderat hævet, rød og øm. Denne reaktion forsvinder over et par dage. Fire timer efter behandlingen må man anvende make-up

Bivirkninger

Infektion ses sjældent, men ved tegn på dette kontaktes læge, da antibiotikabehandling kan være nødvendig. Enkelte får et bumselignende udslæt i området og forkølelsessår kan reaktiveres (herpes). I meget sjældne tilfælde kan rødmen i huden vare i flere måneder eller der kan dannes langvarige bindevævsknuder under og i selve huden. Der kan forekomme ujævnheder i deponeringen af gelen og evt. en overkorrektio n af rynken. Dette svinder spontant i takt med at filleren nedbrydes. Blivende forandringer er yderst sjældne. Fortryder man behandlingen kan filleren fjernes ved indsprøjtning af et enzym, der nedbryder den.

Effekt af behandlingen

Behandlingens effekt er afhængig af indsprøjtningsteknikken, men oftest er der en god effekt med umiddelbar helt eller delvis udglatning af de behandlede rynker.

Holdbarhed og gentagelse af behandlingen

Det er meget individuelt, hvor lang tid behandlingen holder. Det afhænger af mange forskellige faktorer, f.eks. hudens struktur, hudens blodcirkulation, den ønskede korrektionsgrad samt indsprøjtningsteknikken. Som oftest holder resultatet i læberne i ca. 4 til 6 måneder og i panden ca. 6 til 12 måneder. To uger efter første behandling har filleren tilpasset sig i vævet, og på dette tidspunkt er det muligt at genbehandle ved ønske herom.

Kombinationsbehandling med botulinum toxin (botox) kan give et mere holdbart resultat især i området mellem øjenbrynene. Det er her en fordel at behandles med botox først og herefter filler.

Information og samtykke

Efter at have læst denne skriftlige information, skal man have mundtlig information om behandlingen og mulighed for at stille spørgsmål. Man har her mulighed for at medbringe en bisidder. Efter den mundtlige information skal der være mindst 2 dages betænkningstid, før man giver sit samtykke til behandlingen.

Undertegnede erklærer at have læst og forstået ovenstående patientinformation og er indforstået med indholdet heri.

Dato

Underskrift