

Behandling af vorter med beskæring, vortelak & frys

Patientvejledning

Hvad er vorter?

Vorter skyldes smitte med et virus, som kun kan smitte mennesker. I den enkelte vorte dannes konstant nyt virus, som frigives til omgivelserne sammen med afstødte hudceller. Smitte overføres ved berøring eller ved kontakt med de virusholdige afstødte hudceller. Blod smitter ikke. Hvis der er revner eller sår i huden, trænger virus lettere ind. Fra man bliver smittet går der sædvanligvis 3-4 uger før vorten vokser frem. Der kan dog også gå længere tid – op til 20 måneder!

Kroppens immunforsvar danner antistoffer mod vortevirus, ligesom overfor andre vira, f.eks. influenza. I modsætning til f.eks. influenza, sker dette dog meget langsomt, hvorfor vortesygdommen varer længere. Hos børn vil ca. halvdelen helbrede sig selv i løbet af 1 år. Efter 2 år vil to ud af tre være helbredte. Hos voksne varer vortesygdommen dog ofte mange år.

Behandling af vorter

Hvis man vælger at lade kroppen selv bekæmpe sygdommen, bør man nedsætte smitten til sig selv og andre ved at holde vorten dækket med uigennemtrængeligt plaster (f.eks. Sleek-plaster) eller med neglelak.

Vortemiddel, der styrker efter påsmøring nedsætter smitten i dagligdagen. Det anbefales dog at påføre neglelak hvis man skal i svømmehallen.

Vortebehandling er en tidskrævende procedure. Der er ingen vortebehandling, som er velegnet til alle situationer. Valget af behandling afhænger af mange faktorer; alder, antal vorter, lokalisation og effekten af evt. tidligere behandlinger.

I klinikken forefindes også Finsens salve og Grøn Canthacur som kan anvendes i behandlingen af vorter.

Behandlingsinstruks

- Regelmæssighed i behandlingen er nødvendig. Springes behandlinger over, forlænges behandlingstiden betragteligt!

Behandlingen hjemme er ligeså vigtig som behandlingen i klinikken.

- Vorterne kan evt. opblødes i fodbad i 5 minutter.

- Vorten beskæres med skalpel 1-2 gange ugentligt. Man bør såvidt muligt skære/skrabe i hudfurernes retning for at undgå blødning. Skulle der komme blødning hævses foden, og der presses hårdt mod området et par minutter. Fodvorten skal særes ned med der skal ikke laves dybe huller. Huden skal skæres plant.

- Der må ikke anvendes fodfil!

Skalpellen bør have bladstørrelse 15 og knivskæft nr. 3.

- Det ordinerede vortemiddel påføres hver enkelt vorte: Kan eksempelvis være Verucid eller Vortex 27.

- Vorten kan evt. dækkes med uigennemtrængeligt plaster (f.eks. Sleek-plaster). Hvis det sidder dårligt, kan der med fordel anvendes Leukoplast-plaster udenom.

- Behandlingen gentages som ordineret eller før, hvis plasteret falder af.

- Er der svære smerter som følge af behandlingen, kan man evt nøjes med at dække vorten med plaster uden at anvende vortemiddel.

- Besøges svømmehal alligevel, kan vorten i dækkes med neglelak under svømmehalsbesøget, så plaster ikke medtages i vandet. Husk at anvende badetøfler under alle omstændigheder.

- Overhold kontrol- og behandlingstider i hudklinikken, for ikke at trække behandlingen i langdrag.

Vorten skal for så vidt muligt være beskåret hjemmefra.

Vorten svinder hurtigst ved kombination af frysning i klinikken og hjemmebehandling!

HUDKLINIKKEN SKØNVIRKE

Udfærdiget af hudlæge J.E. Borch, Ph.D. 2010. Revideret af J.E. Borch dec. 2021.
Revideres næste gang dec. 2024. ©2010 - 2024