

Hvad er Dapson?

Dapson er et antibiotikum som dæmper betændelsesprocesser og kan anvendes til behandling af visse sjældne hudsygdomme.

Hvordan anvendes Dapson?

Dapson gives som tabletter og tages 1 gang dagligt. Til børn kan Dapson gives som mixtur

Hvor hurtigt virker Dapson?

Dapson virker i løbet af uger til få måneder.

Hvilke bivirkninger kan forekomme?

De fleste tåler Dapson godt. Dapson binder sig til de røde blodlegemer og kan derved hæmme iltningen af blodet. Dette kan medføre træthed, hovedpine, svimmelhed, kvalme og vejrtrækningsbesvær.

I mere sjældne tilfælde kan der forekomme leverpåvirkning, nyrefunktionspåvirkning, knoglemarvspåvirkning, synsforstyrrelser, ændret følesans, nervøsitet eller udslæt.

Hvis du er allergisk over for sulfonamider kan du ligeledes være allergisk overfor Dapson.

Det er derfor vigtigt, at du kontakter din hudlæge, hvis du får bivirkninger.

Før behandlingen

Hvis du ikke er fra Nordeuropa, bør du undersøges for glukose-6-phosphat-dehydrogenase mangel, inden Dapson behandlingen startes. Dette gøres ved hjælp af en blodprøve.

Kontrol af behandlingen

Det er vigtigt med jævnlig blodprøvekontrol. Aftal nærmere med din hudlæge.

Vær særlig opmærksom på

Det er vigtigt at du oplyser hudlægen om din øvrige medicin.

Følgende medicin kan påvirke Dapson behandlingen:

- Probenecid
- Trimetoprim
- Pyrimethamin
- Rifampicin
- Methotrexat

Graviditet og amning

Dapson bør ikke tages i forbindelse med graviditet og amning.

Hudlægen informerer om

Dapson

