

Behandling med røde bade

Patientvejledning

Hvad går behandlingen ud på?

Røde bade udtørre væskende sår og hæmmer væksten af bakterier.

Før behandlingen

Røde bade er en vandig opløsning af kaliumpermanganat (KMnO₄). Kaliumpermanganat 3% må kun anvendes fortyndet. Doseringsforholdet er 10 ml kaliumpermanganat til 1 l vand (stuetemperatur).

Kaliumpermanganat giver rødlig/brunlig misfarvning af hud og negle (heraf navnet røde bade). Farvning af huden forsvinder i løbet af kort tid efter ophør med behandlingen.

Ved anvendelse af neglelak eller vaseline kan misfarvning af neglene undgås.

Behandlingen

Vand og kaliumpermanganat blandes i en plastikbalje eller anden beholder til formålet. Behandlingstid er 20 min. Området duppes tør bagefter med køkkenrulle.

Behandlingsvarighed efter lægens anvisning.

Bortset fra ved behandling af hænder, bør man anvende handsker for at undgå misfarvning. Plastikbaljen bør stilles på en plasticpose for at undgå farvning af gulvet.

Efter behandlingen

Kaliumpermanganat er miljøskadeligt. Efter behandlingen kan man derfor suge vandet op i papir eller gammelt klæde, smide det i skraldespanden eller aflevere det på kommunens genbrugsplads.

Ved misfarvning af gulv anvendes eddikesyre 30% til fjernelse af pletten.