

Frysekirurgisk behandling

Patientvejledning

Flydende kvælstof anvendes til kirurgisk frysning af vorter, solskader og andre hudlidelser. Vævet der behandles, destrueres ved frysningen.

Behandlingen

Behandlingen foretages med flydende kvælstof eller i sjældne tilfælde med isofluran. Den kan foretages med spray, kontaktprobe eller intralæsionelt, hvor en frysenål indføres i det væv, der skal behandles. Frysetiden kan variere fra få sekunder til flere minutter, afhængig af størrelse og beskaffenhed af det, der skal behandles.

Efter behandlingen

Nogle timer efter frysningen, kan den behandlede hud blive rød og hævet. Desuden kan der opstå generende smerte. Smerten plejer at fortage sig samme dag.

Efter ca. 1 døgn kan der komme blæredannelse og/eller sår, som efter nogle dage bliver til skorpe. Skorpen falder af i løbet af 1-3 uger.

- Bliver blæren generende, kan den punkteres med en steril nål.
- Til smertebehandling kan anvendes tablet Paracetamol 500 mg, 2 stk. max. 4 gange daglig.
- Dæk med plaster, hvis det behandlede område væsker.
- Ved sår dannelse kan med fordel smøres med klorhexidinsalve (håndkøb) et par gange dagligt i en uges tid.

Det kan være nødvendigt at gentage behandling med frysning efter nogle uger.