

Hudlægen informerer om

# Imurel

(azathioprin)



Dansk dermatologisk Selskab 2009

I pjecen informeres om behandling med Imurel.  
Hvis der er spørgsmål, som ikke er besvaret, bør de stilles til hudlægen.

#### **Hvordan virker Imurel?**

Imurel indeholder et stof (azathioprin) der nedsætter immunsystemets aktivitet. Nogle kroniske hudsygdomme som f.eks. børneeksem, andre kroniske eksemmer og visse bindevævssygdomme bedres, når immunsystemet hæmmes.  
Den fulde effekt af Imurelbehandlingen ses som regel først efter 6-8 ugers behandling.

#### **Hvordan tages Imurel?**

Tabletterne indeholder 25 eller 50 mg azathioprin og tages i 1 eller 2 daglige doser.

#### **Imurel og anden medicin**

Det er vigtigt at du oplyser hudlægen om din øvrige medicin.

Følgende medicin kan påvirke Imurel behandlingen:

- Allopurinol
- Warfarin
- Cyclophosphamid

#### **Bivirkninger**

Imurel kan hæmme dannelsen af blodplader, hvide og røde blodlegemer. Desuden kan leverfunktionen påvirkes, ligesom der er let øget risiko for betændelse af bugspytkirtlen. Det er derfor vigtigt med jævnlig blodprøvekontrol efter aftale med din hudlæge.

Nedsat appetit og kvalme kan forekomme, specielt i starten af behandlingen, men er ofte forbigående.

Imurel hæmmer immunsystemet og kan derved øge risikoen for infektion. Ved feber og infektionssygdomme under behandling med Imurel skal du derfor kontakte egen læge/vagtlæge og oplyse om behandlingen.

Behandling med Imurel indebærer en let øget risiko for visse kræftformer.

#### **Prævention, graviditet og amning**

Imurel bør ikke indtages under graviditet eller amning. Yngre kvinder skal anvende sikker prævention under behandlingen.

© Copyright Dansk dermatologisk Selskab · 1. udgave 

TRYKKESTEDET ÅRHUS APS - 86 13 62 88